

青霉素过敏反应的临床表现

★ 过敏性休克

最严重的过敏反应，可发生在试验过程中或注射后，一般数秒或数分钟内呈闪电式发生，也有发生在半小时后，极少数发生在连续用药过程中

呼吸道阻塞症状：由喉头水肿、肺水肿引起，表现为胸闷、气促、发绀、呼吸困难、喉头堵塞伴濒死感

皮肤过敏症状：由于毛细血管通透性增高引起，出现皮肤瘙痒、荨麻疹及其他皮疹

★ 最早出现呼吸道症状或皮肤瘙痒，须注意倾听患者的主诉

循环衰竭症状：由于周围血管扩张和通透性增加，导致循环血容量不足，表现为面色苍白、出冷汗、脉细弱、血压急剧下降等

中枢神经系统症状：由于脑组织缺血、缺氧，表现为头晕眼花、面部及四肢麻木、躁动不安、抽搐、意识丧失、大小便失禁等

血清病型反应

一般用药后7~12d发生

★ 患者有发热、皮肤瘙痒、荨麻疹、腹痛、关节肿痛、全身淋巴结肿大等

血清病型反应与过敏性休克的鉴别：
①发生时间：7~12d；②表现：腹痛、关节肿痛、全身淋巴结肿大

各器官或组织的过敏反应

皮肤过敏反应：皮肤瘙痒、皮疹、荨麻疹、皮炎，严重者可发生剥脱性皮炎

呼吸道过敏反应：可引起哮喘或诱发原有的哮喘

消化系统过敏反应：可引起过敏性紫癜，出现腹痛、便血